



ATENȚIE!

GRIPA AVIARĂ

Simptome și măsuri de prevenire



Ce este gripa aviară?

Gripa aviară (*Influența Aviară*) este o boală virală extrem de contagioasă cauzată de virusul gripal H5N8 care afectează mai multe specii de păsări de la care obținem produse alimentare (găini, curcani, prepelițe, bibilici, etc.), precum și păsările de companie și păsările sălbatice. Ocazional boala o pot contracta mamiferele și omul.



Perioada de incubație este de 4-6 zile.

Cum poate fi răspândită gripa aviară?

Factorii care pot contribui la răspândirea virusului :

- globalizarea și comerțul internațional;
- piețele de păsări vii;
- păsările sălbatice și rutele de migrație

La păsări, virusul GA poate fi răspândit prin contact direct cu secreții de la păsările infectate, în special prin materiile fecale sau prin intermediul echipamentului, hranei și apei contaminate. Păsările sălbatice pot transporta virusurile în tractul respirator sau intestinal, dar acestea nu se îmbolnăvesc în mod obișnuit, ceea ce le permite să elimine viruși pe distanțe lungi.

Cum se manifestă infecția?

Simptome clinice:

- Inapetență, încetarea ouatului;
- Respirație greoaie, tuse, febră;
- Creasta și bărbițele umflate, de culoare roșu închis;
- Pete vinete pe picioare și secreții din cioc și nări;
- Diaree apoasă, de culoare verzuie;
- Inflamarea zonelor din jurul ochilor și gâtului.
- aripi zburlite, torticolis, răsucirea gâtului, paralizie.

Ce trebuie de întreprins ?

- Anunțați medicul veterinar cu privire la orice caz de îmbolnăvire sau moarte la animale și păsări.
- Nu puneți mâna goală pe cadavrele păsărilor.
- Țineți păsările închise în adăposturi, pentru a evita contactul cu păsările din alte gospodării sau sălbatice.
- Nu lăsați rațele și găștele pe bălți sau lacuri.

Ce trebuie să facă crescătorii de păsări din ferme?


- Trebuie să respecte normele de biosecuritate și să acorde tot sprijinul medicilor veterinari și autorităților sanitar-veterinare.
- Să fie respectate regulile privind circulația și transportul păsărilor.



ATENȚIE

ATENȚIE !
DIRECTIA SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR VASLUI RECOMANDĂ:
NOTIFICAREA D.S.V.S.A. VASLUI LA NUMĂRUL DE TELEFON 0235421121 DACĂ ÎN CAZUL DEPISTĂRII
DE CADAVRE DE PĂSĂRI DOMESTICE SAU SĂLBATICE

**DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
VASLUI
RECOMANDĂRI PENTRU PRODUCEREA DE LAPTE ȘI PRODUSE
LACTATE DE CALITATE**



Cum se poate obține lapte conform cu cerințele Uniunii Europene?



Păstrați curățenia în adăposturile vacilor;

Asigurați așternut curat pentru menținerea igienei vacilor;

Îndepărtați bălegarul, urina, praful, noroiul, așternutul murdar;

Îndepărtați resturile de furaj înainte de începerea mulsului;

Nu hrăniți vacile cu fân sau paie în timpul mulsului;

Nu schimbați așternuturile de paie în timpul mulsului;

Verificați dacă vacile de lapte prezintă boli ale ugerului;

La cel mai mic semn de boală mulgeți-le separat și amunați medicul veterinar;

Spălați bine ugerul și mameloanele și ștergeți-le cu un prosop curat;

Legați coada animalului înainte de începerea mulsului;




Spălați-vă mâinile și îmbrăcați un halat de protecție curat; dacă aveți răni deschise ale pielii mâinilor acoperiți-le cu bandaje igienice rezistente la apă

sau folosiți mănuși de protecție;


Spălați cu detergent și clățiți bine gălețile și bidoanele folosite pentru lapte înainte de începerea mulsului;

Eliminați primele jeturi de lapte;



Mulgeți laptele în vase curate;

Filtrați și depozitați laptele imediat după muls în vase curate, acoperite, într-o încăpere separată de adăpostul vacilor;



Răciți laptele imediat după muls, la o temperatură de maxim 8°C atunci când este colectat zilnic și la 6°C atunci când colectarea nu este efectuată în fiecare zi;

Dacă nu dețineți echipamente adecvate pentru păstrarea și răcirea laptelui, transportați laptele cât mai rapid la centrul de colectare, pentru a fi răcit și păstrat corespuizător.



STOP AFRICAN SWINE FEVER

Prevent spread

Clean your footwear

Disinfect your equipment

Detect the signs

Fever

Loss of appetite

Lack of energy

Bleeding

Vomiting

Redness of the skin

Death

Report suspicious cases to your veterinarian



www.efsa.europa.eu/StopASF #StopASF



European Food Safety Authority



STOP AFRICAN SWINE FEVER

Prevent spread

Disinfect your equipment before leaving the hunting area

Avoid visiting pig farms after hunting

Do not leave wild boar offal and waste in forests and fields

Keep your distance if you come across a dead boar

Do not feed game meat to animals

Report sick or dead boar to local authorities



www.efsa.europa.eu/StopASF #StopASF



European Food Safety Authority